


Vairon (*Phoxinus phoxinus*)



Morphologie et anatomie

Taille : moyenne 8 cm, maximum 12 cm

Poids : moyen 10 g, maximum 25 g

Description physique : Le Vairon est un petit poisson au corps allongé presque cylindrique. Il a un museau arrondi, avec une mâchoire supérieure légèrement plus avancée que la mandibule. Il est de couleur verte, plus foncé sur le dos et presque blanc sur le ventre. Les flancs présentent des taches de forme variable et une ligne latérale sombre bien visible. Le mâle devient très coloré lors du frai, associant le noir, le blanc, le rouge, le jaune et le vert vif.

Biologie

Alimentation : Le vairon est un omnivore opportuniste. Il se nourrit aussi bien d'alevins et d'œufs des autres espèces, mais aussi de sa descendance.

Reproduction : Il se reproduit d'Avril à Juillet dans une eau à 12 °C. La femelle pond entre 200 et 500 ovules chez les plus jeunes individus, mais les plus âgées peuvent pondre jusqu'à 3000 ovules. Les pontes sont fractionnées, avec un pic en Mai-Juin. La femelle ne pond ses œufs que sur du gravier propre et bien oxygéné.

Maturité sexuelle : 1 à 2 ans pour les mâles, 2 à 3 ans pour les femelles.

Durée de vie : moyenne 3 à 4 ans, maximum 5 à 6 ans.

Écologie


Habitat : Espèce grégaire, le vairon vit en banc qui peuvent aller d'une dizaine à plusieurs milliers d'individus. Il affectionne les eaux claires, plutôt fraîches et bien oxygénées.

Zonation piscicole : De la zone à truite à la zone à barbeau.

Sensibilités : Espèce peu menacée, mais qui a tendance tout de même à se raréfier en raison de la dégradation physique des cours d'eau et de la dégradation de la qualité de l'eau.




Distribution



Espèce autochtone, le vairon est présent en Eurasie septentrionale depuis l'Irlande à l'Ouest jusqu'à l'extrémité de la Sibérie à l'Est. Il est absent de l'Écosse, du Sud de l'Espagne, du Sud de l'Italie et de la Grèce.

Il est très largement répandu sur tout le territoire national. Il fait l'objet d'élevage, notamment pour la vente comme appât et fut introduit dans certains lacs de haute montagne (à parfois plus de 2500 m d'altitude) et sur certains fleuves côtiers provençaux.

Répartition Vairon (*Phoxinus phoxinus*)



Répartition dans le département

Le vairon est très répandu sur l'ensemble des cours d'eau du département. Les abondances sont globalement moyennes mais peuvent être parfois très importantes, en particulier sur des cours d'eau comme la Galaure, l'Herbasse et la Bourne.

Enjeux / Actions de préservation

L'enjeu pour cette espèce est la préservation de la ressource en eau, la bonne oxygénation de l'eau ainsi que la lutte contre les pollutions diverses.